


# Cáncer de Cuello Uterino



Cuello Uterino

**Biopsia:** Consiste en tomar una pequeña muestra del endometrio para que pueda ser estudiada y poder confirmarse o no la existencia de un cáncer.

**Ecografía vaginal:** Permite valorar el grosor del endometrio. Si está engrosado indica la existencia de enfermedad, aunque no es específico de un cáncer.

La exploración ginecológica: En este

examen el ginecólogo valora la existencia o no de nódulos u otras lesiones en la vagina, el cuello del útero y el cuerpo del útero.

**Legrado.** Es una intervención menor, hecha bajo anestesia general, que consiste en dilatar ligeramente el cérvix para introducir en la cavidad uterina un instrumento en forma de cucharilla (legra) para raspar la pared del útero y tomar muestras del endometrio.

---

Calle Tarata N° 269 Oficina 213 Miraflores, Lima 18 - Perú  
Teléfonos: 241 0472 / 241 0465 / 446 9253 Fax: 241 0474  
E-mail: fundacion@cancer.org.pe www.cancer.org.pe



Fundación Peruana de Cáncer

# Cáncer de Cuello Uterino

El cuello uterino es el extremo inferior, estrecho del útero (el órgano hueco, en forma de pera donde se desarrolla el feto).

El cáncer de cuello uterino generalmente se desarrolla lentamente con el paso del tiempo. Antes de que el cáncer aparezca en el cuello uterino, las células del cuello uterino atraviesan cambios llamados displasia, en los cuales las células que no son normales empiezan a aparecer en el tejido del cuello uterino. Luego, las células cancerosas comienzan a crecer y diseminarse más profundamente en el cuello uterino y las áreas cercanas.

La infección del cuello uterino por el virus del papiloma humano (VPH) es la causa más común del cáncer de cuello uterino. No obstante, no todas las mujeres con infección por el VPH padecerán de cáncer de cuello uterino.

Existe una vacuna eficaz en la prevención del cáncer, así como también en lesiones precancerosas o displásicas, verrugas genitales e infecciones, para mujeres entre los 9 y 26 años que aún no han iniciado su vida sexual.

## ¿Cuáles son los síntomas?

El cáncer de cuello uterino puede no causar signos o síntomas perceptibles. Otras

afecciones pueden ocasionar los mismos síntomas. Debe consultarse con un médico si se presenta cualquiera de los siguientes problemas:

- Sangrado vaginal.
- Flujo vaginal inusual.
- Dolor pélvico.
- Dolor durante las relaciones sexuales.

## ¿Quiénes corren mayor riesgo?

Las mujeres que generalmente no se someten a una prueba de Papanicolaou para detectar el VPH o células anormales en el cuello uterino tienen mayor riesgo de padecer de cáncer de cuello uterino. Otros factores de riesgo posibles son:

- Dar a luz a muchos niños.
- Tener muchas parejas sexuales.
- Mantener la primera relación sexual a una edad temprana.
- Fumar cigarrillos.
- Usar anticonceptivos orales ("la píldora") por tiempos prolongados.
- Tener debilitado el sistema inmunitario.

## ¿Cómo se diagnostica?

**Papanicolaou (PAP):** Consiste en tomar células de la superficie del cuello uterino y la vagina. Estas son examinadas bajo un microscopio para determinar si son anormales.

Auspicia:

 **Grambs**  
Corporación Gráfica

[www.cancer.org.pe](http://www.cancer.org.pe)